

BROMUS 25 Pép Professzionális felhasználóknak

"Rágcsálók elleni védelem"



BROMUS 25 Pép Professzionális felhasználóknak

Kategória: Biocid

Használatra kész rágcsálóirtó csali, pép formájában professzionális felhasználóknak

Engedélyezési szám:

HU-2021-SP-14-00324-0000

Leírás:

A BROMUS 25 Pép használatra kész rágcsálóirtó csali, amely Brodifacoum nevű véralvadásgátló hatóanyagon alapul, és házi egerek (*Mus musculus*), közönséges patkányok (*Rattus norvegicus*) és fekete patkányok (*Rattus rattus*) ellen is hatásos, egyszeri lenyelés esetén is. A készítmény -ahogy neve is mutatja- pép, amely a jelzett rágcsálófajok számára ízletes.

A termék nem riaszt és nem kelt gyanút más rágcsálópopulációkban.

A BROMUS Pép keserű anyagot tartalmaz, hogy megakadályozza a gyermekek véletlen lenyelését.

A BROMUS Pép ipari épületekben és környékükön (beleértve a raktárakat, üzleteket, hajótartókat), lakóépületekben, pincékben, garázsokban, raktárakban, kertekben és szabadterei területeken használható.

Összetétel:

100 gramm termék tartalmaz:

Brodifacoum: 0,0025 g

Denatónium -benzoát: 0,0010 g

Használat:

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLATI MÓDSZEREK

Beltéri használatra: házi egerek (*Mus musculus*) elleni védekezésre.

Tegyen tartálynként 20-40 g BROMUS 25 Pépet, amely 1-2 csalinak felel meg, a 20 gr-os adagból vagy 4-5 darabot tegyen ki a 10 gr-os kiszereleésből.

Ha egynél több tartályra van szükség, helyezze őket egymástól körülbelül 10-15 méterre.

A tartályokat a kezelés kezdetén 2-3 naponta, majd ezt követően legalább hetente ellenőrizni kell. Ez azért történik, hogy ellenőrizzék a tartályok épségét, a csali fogyasztását, és szükség esetén eltávolítsák a rágcsáló tetemét. Szükség esetén tölts fel csalival.

Kövesse a további utasításokat, amint azt a vonatkozó helyes gyakorlat megköveteli.

Beltéri használatra: közönséges patkányok (*Rattus norvegicus*) elleni védekezéshez:

BROMUS 25 Pép Professzionális felhasználóknak

"Rágcsálók elleni védelem"

Helyezzen tartályba 100-200 g BROMUS 25 Pépet, ami 5-10 csalinak felel meg, használatra kész, 20 g-os kiszerelésben, vagy 10-20 csalinak felel meg 10 g-os használatra kész kiszerelésben.

Ha egynél több tartályra van szükség, helyezze őket 5-10 méterre egymástól.

A tartályokat a kezelés kezdetén 5-7 naponként, majd ezt követően legalább hetente ellenőrizni kell. Ez azért történik, hogy ellenőrizzék a tartályok épségét, a csalétek fogyasztását, és szükség esetén eltávolítsák a rágcsáló tetemeiket. Szükség esetén töltsse fel csalival.

Kövesse a további utasításokat, amint azt a vonatkozó helyes gyakorlat megköveteli.

Kültéri használat, épületek körül: házi egerek (*Mus musculus*) védelmére.

Tegyen tartályonként 20-40 g BROMUS 25 Pépet, amely 1-2 csalinak felel meg, használatra kész, 20 g-os kiszerelésben, vagy 2-4 csalinak felel meg 10 g-os, használatra kész kiszerelésben.

Ha egynél több tartályra van szükség, helyezze őket 5-10 méterre egymástól.

Védje a csalt az időjárástól (pl. Eső, hó stb.). Helyezze a csalétek tartályait olyan helyekre, ahol nincs árvíz.

A csalétek tartályait a kezelés kezdetekor legalább 2-3 naponta, majd ezt követően legalább hetente ellenőrizni kell, hogy a csali elfogadott-e, a tartályok sértetlenek-e, és hogy eltávolítsák a rágcsáló tetemét. Szükség esetén töltsse fel újra a tartályt. Cserélje ki a csaléteket a tartályokban, ha víz károsítja vagy szennyeződik.

Kövesse a további utasításokat, amint azt a vonatkozó helyes gyakorlat megköveteli.

Kültéri használatra, épületek körül: szürke patkányok (*Rattus norvegicus*) elleni védekezésre.

Helyezzen tartályba 100-200 g BROMUS 25 Pépet, ami 5-10 csalinak felel meg, használatra kész, 20 g-os friss pasztában, vagy 10-20 csalinak felel meg 10 g-os használatra kész friss pasztában. minden egyes.

Ha egynél több tartályra van szükség, helyezze őket 5-10 méterre egymástól.

Védje a csalt az időjárástól (pl. Eső, hó stb.). Helyezze a csalétek tartályait olyan helyekre, ahol nincs árvíz.

A csalétek tartályait a kezelés kezdetekor legalább 5-7 naponként, majd ezt követően legalább hetente ellenőrizni kell, hogy a csali elfogadták-e, a tartályok sértetlenek-e, és szükség esetén eltávolítsák a rágcsáló tetemeiket. Szükség esetén töltsse fel újra a tartályt. Cserélje ki a csaléteket a tartályokban, ha víz károsítja vagy szennyeződik.

Kövesse a további utasításokat, amint azt a vonatkozó helyes gyakorlat megköveteli.

Felhasználók:

Professzionális

Figyelmeztetések:

Használat előtt olvassa el és kövesse a termékre vonatkozó utasításokat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítési helyen rendelkezésre álló információkat.

A csalétek elhelyezése előtt ellenőrizze a fertőzött területet, és végezzen helyszíni értékelést a rágcsálófajok, tevékenységi helyek azonosítására, valamint a fertőzés valószínű okának és mértékének meghatározására.

Távolítsa el az élelmiszerforrásokat a rágcsálók számára könnyen elérhető helyen (pl. Kiömlött gabona vagy élelmiszerhulladék).

Ezenkívül ne tisztítsa meg a fertőzött területet közvetlenül a kezelés előtt, mivel ez csak zavarja a rágcsálók populációját, és megnehezíti a csalétek elfogadását.

A terméket csak integrált kártevő -védelmi (IPM) rendszer részeként szabad használni, amely többek között higiéniai intézkedéseket és lehetőség szerint fizikai védekezési módszereket is tartalmaz.

Fontolja meg a megelőző védekezési intézkedéseket a csali felvételének ösztönzésére és az újrafertőzés valószínűségének csökkentésére (pl. A lehetséges nyílások elzárása, a lehetséges élelmiszer- és vízforrások lehető legnagyobb mértékű eltávolítása).

A csalétek tartályát olyan helyek közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol a rágcsálók tevékenységét korábban igazolták (pl. Sétányok, fészkek, állatállomány bejáratok kerítése, nyílások, odúk stb.).

Ahol lehetséges, rögzítse a csalétek tartályait a talajhoz vagy más szerkezetekhez. A csalétek tárolását egyértelműen fel kell tüntetni, jelezve, hogy rágcsálóirtó szereket tartalmaznak, és nem szabad eltávolítani vagy kinyitni.

Ha a terméket nyilvános helyiségekben használják, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelési időszak alatt. A csalétek mellett figyelmeztetést kell elhelyezni, amely jelzi az elsődleges és másodlagos véralvadást okozó mérgezés kockázatát, valamint a mérgezés esetén meghozandó elsősegélynyújtási intézkedéseket.

A csalt úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen kihúzni a csali tartályából.

A terméket gyermekektől, madaraktól, háziállatoktól, haszonállatoktól és más nem célzott állatoktól távol helyezze el. Helyezze el a terméket élelmiszerektől, italoktól és állati takarmányoktól, valamint olyan eszközöktől vagy felületektől távol, amelyek érintkezhetnek a termékkel.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék használatakor.

A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. A termék használata után közvetlenül mosson kezet.

**BROMUS 25 Pép Professzionális
felhasználóknak****"Rágcsálók elleni védelem"**

Ha a csalétek fogyasztása a fertőzés bizonyítható mértékéhez képest alacsony, fontolja meg a csalihelyek más helyre történő áthelyezését és a csali összetételének megváltoztatását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után továbbra is csalétket fogyasztanak, és nem figyelhető meg a rágcsálók aktivitásának csökkenése, meg kell határozni a legvalószínűbb okot. Ha más elemeket már kizártak, akkor valószínűleg rezisztens rágcsálók vannak jelen, ezért fontolja meg egy nem antikoaguláns rágcsálóirtó szer vagy egy hatékonyabb véralvadásgátló rágcsálóirtó szer használatát. Fontolja meg a csapdák alternatív ellenőrzési intézkedésként való alkalmazását.

A kezelési időszak végén távolítsa el a maradék csalit vagy csalitartályokat.

A csalétektároló edényeket a következő információkkal kell ellátni: „ne mozgassa vagy nyissa ki”; „Patkánymérget tartalmaz”; „Termék neve vagy engedélyezési száma”; „Hatóanyag (ok)” és „baleset esetén forduljon mérgezési központhoz”.

Veszélyes a vadon élő állatokra.

Csomagolás:

1.5 KG-os csomag

10 KG-os doboz

Megjegyzés:

Óvatosan használja a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat. Felhívjuk a figyelmet a címkén található veszélyes figyelmeztetésekre és szimbólumokra.

A specifikációk szövege megfelel az Nemzeti Népegészségügyi Központ által jóváhagyott címkének.